

# Laura

IZUZETNO KVALITETNA SORTA POGODNA  
ZA SVE VRSTE UPOTREBE U KULINARSTVU,  
POGODNA ZA ČUVANJE, ATRAKTIVNOG  
IZGLEDA I BOJE



- VEOMA LIJEPI, UJEDNAČENI, IZDUŽENI OVALNI GOMOLJI, CRVENE POKOŽICE
- SORTA IZUZETNOG UKUSA, POGODNA I ZA OBRADU U PROIZVODNJI POMFRITA

**Laura** ima srednje zahtjeve prema zemljištu i snabdjevanju vodom. Zemljišta sa mogućnostima širenja viroze treba izbjegavati.

**Laura** daje veoma lijepo oblikovane gomolje crvene pokožice, srednje do veće veličine, izuzetnog kulinarskog okusa. Zbog srednjeg stupnja tuberizacije preporučena gustoća biljaka bi trebala biti oko 46.000 biljaka/ha za konzumnu, a 41.000 biljaka/ha za industrijsku proizvodnju (tuberizacija – razvoj krtola u periodu vegetacije; viša stopa tuberizacije – razvija se veći broj gomolja, i obrnuto). Tretiranje sjemena radi kontrole *Rhizoctonia solani* je preporučljivo.

**Laura** je osjetljiva na herbicid Metribuzine (Sencor, itd.). Visoke doze, kao i tretiranje nakon pojavljivanja problema treba izbjegavati.

**Laura** daje veoma lijepe gomolje sa crvenom pokožicom, izuzetne kulinarske kvaliteta, pogodne za proizvodnju pomfrita.

**DOZRIJEVANJE  
OBLIK GOMOLJA**

**BOJA I IZGLED POKOŽICE  
BOJA MESA  
PRINOS**

**UJEDNAČENOST VEL. GOMOLJA  
UPOTREBNA VREDNOST**

**RASPADANJE PRI KUHANJU**

**SREDNJE RANO  
OVALNI DO IZRAŽENO  
OVALNI**

**CRVENA, LIJEPA, GLATKA  
TAMNO ŽUTA  
VELIK DO VRLO VELIK**

**VISOKA  
VISOKA – IZUZETAN**

**ZANEMARLJIVO**



**Preporuka za uzgoj:** Sorta **Laura** traži teža tla, na laganijim tlima može doći do pojave krastavosti. Na dubokim, strukturnim tlima, sa dovoljno organske tvari, treba smanjiti gnojidbu dušikom za 50%. Saditi treba rano, naklijale gomolje, u dobro obrađeno tlo. Za postizanje srednje krupnoće gomolja treba postići sklop od 45,000 gomolja/ha, a za krupnije gomolja 42,000 gomolja/ha.

**Gnojidba:** Na dobrim tlima dovoljno je 100 kg/ha N, 130-150 kg/ha P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 180-200 kg/ha K<sub>2</sub>O, te oko 100 kg/ha MgO. **Ne prihranjivati dušikom.**

**Njega usjeva:** Preporučuje se tretiranje gomolja prije sadnje protiv *Rhizoctonia* (bijeleg noge). Iako je Laura prilično otporna na plamenjaču, neophodno je štiti usjev. Do zatvaranja redova i kratko nakon toga, koristiti kontaktne fungicide, zatim 2-3 puta sistemične, a kad cima prestane rasti, ponovno koristiti kontaktne fungicide. Pri tome treba mijenjati aktivne tvari. Potrošnja vode po prskanju trebala bi biti od 500 do 600 l/ha.

**Vađenje:** Prije vađenja obično je potrebno uništiti cimu i pričekati da pokožica dobro očvrstne, a zbog manjeg oštećivanja gomolja preporučuje se vađenje pri temperaturi 15-20° C.

<b>Dozrijevanje</b>	<b>Srednje rana</b>	<b>Gomolji</b>	<b>Ovalan – izduženo ovalan Crvena, lijepa, glatka Plitka Žuta – svjetlo žuta Niska</b>
<b>Kulinarski tip</b>	<b>B</b>	<b>Oblik gomolja Pokožica</b>	
<b>Rani razvoj</b>	<b>Brz, rano zatvara redove</b>	<b>Dubina okca Boja mesa Sirova diskoloracija</b>	
<b>Konzumni kvalitet</b>	<b>Kvalitetan konzumni krumpir, tamno žuta boja mesa, izuzetan ukus, nema diskoloracije nakon kuhanja, pogodan za proizvodnju pomfrita, dugo drži kvalitetu</b>	<b>Otpornost PCN Krumpirov virus kovrčanja lista Krompirov virus Y (PVY)</b>	<b>Ro 1-5 Visoka</b>
<b>Prinos</b>	<b>Vrlo visok tržišno pogodan prinos, ujednačeni gomolji srednjih i većih dimenzija</b>	<b>Krastavost krompira</b>	<b>Veoma visoka Srednja Visoka - srednja</b>
<b>Čuvanje</b>	<b>Visoka uspavanost, dobro skladištenje</b>	<b>Osjetljivost Viroze Udarci Mehanička oštećenja</b>	<b>Niska Niska Niska - srednja</b>

*Podaci iz tabele su napravljeni na osnovu originalnih testiranja sorti i/ili na osnovu iskustva proizvođača. Međutim, kako je krumpir proizvod prirode, ne možemo preuzeti odgovornost za gore navedene podatke.*

**Proizvođač sjemena i izvoznik za Hrvatsku:  
Europlant Pflanzenzucht, Lüneburg, Njemačka**

