

**KVALITETA RANA SORTA,
ŽUTOG KOZUMNOG
KRI MPIRA, OTPORNA NA
NEMATODE (Ro 1) I VIRUSE**



- RANA ŽUTA SORTA
- ODLIČNA KVALITETA
- VISOK PRINOS
- KRUPICA; UJEDNAČENEC;
- ; CAČU ŽUTE BOJE
- PODNOSI SUŠU

Vineta N ima naglašenu uspavanost, vrlo dobru mogućnost skladištenja i vrlo visoku otpornost na sve vrste bolesti i na sušne uvjete.


Vineta N će dati veći prinos ukoliko se radi naklijavanje. Treba se saditi sa 28 – 30 cm u redove od 75 cm.

Vineta N gledano ima srednje zahtjeve, previše će odložiti zrelost i smanjiti kvalitetu skladištenja.

Vineta N je sorta izuzetno tolerantna i izdrživa u pogledu sušnih uvjeta, sa visokim stepenom otpornosti na viruse kao što su PVY, PVA, PLRV i druge bolesti.

Vineta N proizvodi škrob u ranom periodu vegetativne faze.

VINETA



Preporuka za uzgoj: **Vineta** traži dobra tla koja dobro drže vodu, naročito u periodu formiranja [cačU]. Saditi treba rano, naklijale [cačY, u dobro obrađeno tlo. Za postizanje srednje krupnoće [cačU treba postići sklop od 45,000 biljaka/ha, a za krupnije [cačY 40-42,000 biljaka/ha.

; **bcčXVU:** Na dobrim tlima dovoljno je 100-120 kg/ha N, 120-140 kg/ha P₂O₅, 160-180 kg/ha K₂O, te oko 60-80 kg/ha MgO.

Nega usjeva: Preporučuje se tretiranje [cačU prije sadnje protiv Rhizoctonije (bjele noge). Neophodno je štiti usjeve protiv plamenjače. Do zatvaranja redova i kratko nakon toga koristiti kontaktne fungicide, zatim sistemične (najviše dva puta), a kad cima prestane rasti, ponovo koristiti kontaktne fungicide. Pri tome treba mijenjati aktivne supstance. S obzirom na rano formiranje [cačU, u slučaju suše treba navodnjavati. Sa navodnjavanjem treba početi rano, čime se postiže veći broj [cačU, a ujedno se smanjuje i zaraza krastavošću.

Vađenje: Prije vađenja, ako je potrebno, treba uništiti cimu i pričekati da pokožica dobro očvrstne, a zbog manjeg oštećivanja [cačU preporučuje se vađenje pri temperaturi 15-20° C. Za vađenje tlo mora biti suvo.

Dozrijevanje	Rano	; ca c^ Oblik krtole Dubina okca Boja mesa Pokožica	Kružno ovalan Plitka do srednje dubine Svjetlo žuta Glatka/blago hrapava
Epilobij (EAPR)	B Uglavnom čvrsto kućanje, blago brašnjavog karaktera		
Konzumni kvalitet	Dobar, brašnjavog karaktera	Otpornost " " " " Krompirov virus Y (PVY) Krompirov virus A (PVA) Virus uvijanja lista (PLRV) Krastavost krompira (Streptomyces scabies) Crna nožica (Erwinia spp.) " " (Phytophthora infestans)	Ro 1 . Veoma visoka Veoma visoka Veoma visoka Srednja Visoka " " Jlgu_U
Kalibracija	uj 1/2 U Veoma visok		
Prinos Rani razvoj	Brz, rano zatvara redove		
Čuvanje	Visoka usposobljenost (dobro čuvanje), dugo zadržava kvaliteti	Osjetljivost Udarci Mehanička oštećenja	Veoma niska Veoma niska

Podaci iz tabele su napravljeni na osnovu originalnih testiranja sorti i/ili na osnovu iskustva proizvođača. Međutim, kako je krumpir proizvod prirode, ne možemo preuzeti odgovornost za gore navedene podatke.

Proizvođač sjemena i izvoznik za Hrvatsku:
Europlant Pflanzenzucht, Lüneburg, Njemačka

